

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de mayo y hasta el 30 de junio de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
CISTUS CANADENSIS		
NOMBRE CIENTÍFICO. Helianthemum canadense (L.) Michx. Crocianthemum canadense (L.) Britton		
FAMILIA. Cistaceae.		
SINÓNIMOS		
Latín. Helianthemum canadense (L.) Michx, Cistus helianthemum, G. Cistus ramuliflorum Poir., Helianthemum corymbosum Pursh., H. Helianthemum ramuliflorum Michx., H. rosmarifolium, Heteromeris canadense (L.) Spach., H. Heteromeris michauxii Spach., Lechea major L.		
Español. Cisto canadiense.		
Otros. Cistus helianthemum.		
DESCRIPCIÓN. Herbácea caducifolia perenne, de 30 a 60 cm de altura, con tallo pubescente, simple al principio. Las hojas son simples enteras; opuestas las inferiores y alternas las superiores. Las flores son amarillas, de dos clases, las		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
<p>primarias son pocas o solitarias, grandes, pediceladas; las secundarias son pequeñas, casi sentadas y se agrupan en racimos axilares. Aparecen de junio a agosto; sólo se abren una vez durante el día y tiran sus pétalos al día siguiente. En otoño, la secreción que mana de la corteza agrietada en la raíz se encuentra cristalizada por el frío de las mañanas.</p>		
<p>HÁBITAT. En regiones secas y arenosas de Norteamérica; de Maine a Wisconsin.</p>		
<p>HISTORIA. La introdujo en la práctica homeopática, en 1835, el Dr. Bute; la menciona el Dr. C. Hering en el <i>Hahnemann Month Supplement</i>, Vol. I, (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i>, III: 333).</p>		
<p>PARTES UTILIZADAS. La planta entera fresca.</p>		
<p>PREPARACIONES</p>		
<p>Tintura φ. FM Concentración 1/10</p>		
<p>100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a</p>		
<p>200 mL..... 300 g</p>		
<p>Agua purificada..... 300 mL</p>		
<p>Alcohol 537 mL</p>		
<p>Para obtener 1 000 mL de tintura.</p>		
<p>Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, cuatro volúmenes de agua purificada, cinco volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.</p>		
<p>Trituraciones. 1x y siguientes.</p>		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.