

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
CONDURANGO		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Marsdenia reichenbachii</i> Triana. <i>Marsdenia cundurango</i> Rchb.f.		
FAMILIA. Asclepiadaceae. Apocynaceae.		
SINÓNIMOS		
Latín. <i>Condurango</i>; <i>Marsdenia reichenbachii</i> Triana, <i>Echites acuminata</i>, <i>E. hirsuta</i>, <i>Equatoria garciniana</i>, <i>Glonolubus cundurango</i>, <i>G. tetragonus</i>, <i>Pseusmagennetus equatoriensis</i> <i>Ruschenb.</i>		
Español. Hierba del cóndor.		
Otros. <i>Marsdenia cundurango</i> <i>Echites hirsuta</i>, <i>Echites acuminata</i>, <i>Equatoria garciniana</i>, <i>Gonolobus cundurango</i>, <i>Gonolobus tetragonus</i>.		
DESCRIPCIÓN. Enredadera de 3 a 10 m de largo, de 3 a 5 cm de diámetro, con corteza lisa, de color gris cenizo, más o menos marcada con líquenes negros o verdosos. La corteza viene en forma de rollos, de aproximadamente 2 a 5 mm de espesor,		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
de color pardo grisáceo, externamente arrugada y verrugosa; la superficie interna es de color más claro y salpicada con células de color marrón claro. Es inodora.		
HÁBITAT. Ecuador, Perú y en la cordillera andina.		
HISTORIA. La menciona en la literatura homeopática, en 1871, el Dr. Dunham, <i>Trans. Am. Inst. Hom.</i> 31. (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i> , IV: 1).		
PARTE UTILIZADA. La corteza seca.		
PREPARACIONES		
Tintura φ. FM Concentración 1/10		
Materia vegetal reducida a polvo moderadamente grueso100 g		
Agua purificada500 mL		
Alcohol537 mL		
Para obtener 1 000 mL de tintura.		
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, cuatro volúmenes de agua purificada, cinco volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.