

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
ASCLEPIAS TUBEROSA		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Asclepias tuberosa</i> L.		
FAMILIA. Asclepiadaceae.		
SINÓNIMOS		
Latín. <i>Asclepias tuberosa</i> , <i>A. Asclepias decumbens</i> L.		
Español. Raíz del cólico, vinctósigo.		
DESCRIPCIÓN. Herbácea perenne con raíz gruesa y carnosa, ramificada, blanca y en ocasiones fusiforme, de 3 a 15 cm de largo y 1 a 3 cm de diámetro, con cabeza irregular y nudosa, anulada, con arrugas longitudinales, de color pardo anaranjado por fuera y blanco amarillento por dentro; corteza delgada e inodora. Tallos numerosos, de 30 a 90 cm de altura, erectos o bien oblicuos, redondos, hispídos, de color verde o rojo, ramificados en su parte superior. Hojas alternas; las inferiores pecioladas, las superiores sentadas,		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
hispidas, de color verde oscuro por el haz y verde claro por el envés, de bordes ondulados y en las plantas viejas, revolutos. Las flores que aparecen de julio a agosto son numerosas, erectas, de color anaranjado intenso, dispuestas en corimbos terminales. Semillas ovaladas, planas, marginales, que terminan en largos vellos sedosos. A diferencia de otras plantas de esta familia, carece de salvia lechosa.		
HÁBITAT. Estados Unidos de América, de Massachusetts hasta Georgia y hacia el occidente, hasta Texas.		
HISTORIA. La menciona en la literatura homeopática, en 1856, Savary, <i>N. Z. f. H. K.</i> 5. (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i> , I: 591).		
PARTE UTILIZADA. La raíz fresca.		
PREPARACIONES		
Tintura φ. FM Concentración 1/10		
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 233 mL 333 g		
Agua purificada 167 mL		
Alcohol 635 mL		
Para obtener 1 000 mL de tintura.		
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.