

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

| Dice | Debe decir | Justificación* |
|---|------------|----------------|
| ARUM TRIPHYLLUM | | |
| NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott. | | |
| FAMILIA. Araceae. | | |
| SINÓNIMOS | | |
| Latín. <i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Torr., <i>Arum atrorubens</i> Aiton. | | |
| Español. Arisema trífila, nabo del indio, raíz de dragón. | | |
| DESCRIPCIÓN. Herbácea perenne caducifolia. La raíz, un corno en forma de nabo, tiene la parte inferior carnosa, con abundantes raicillas blancas dispuestas en círculo en torno al punto de unión con el pedúnculo, por lo general con dos hojas opuestas situadas en pedúnculos envolventes largos. El espádice es generalmente dioico, en forma de clava, obtusa, mucho más corto que la espata, la cual está aplanada y curvada hacia | | |

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

| Dice | Debe decir | Justificación* |
|--|------------|----------------|
| adentro, rematada por el peciolo y la bráctea verde o a menudo abigarrada con morado oscuro o franjas o manchas blancuzcas. Florece de mayo a julio. | | |
| HÁBITAT. Originaria de Estados Unidos de América y Canadá. Crece en bosques y en lugares húmedos. | | |
| HISTORIA. La incorporó a la práctica homeopática en 1844 el Dr. James, conforme a lo publicado por C. Hering en <i>Hom. News</i> , 1856. (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i> , I: 561). | | |
| PARTE UTILIZADA. La raíz fresca. | | |
| PREPARACIONES | | |
| Tintura φ. FM Concentración 1/10 | | |
| 100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 400 mL 500 g | | |
| Alcohol 635 mL | | |
| Para obtener 1 000 mL de tintura. | | |
| Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial. | | |

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.