

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

### COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: [consultas@farmacopea.org.mx](mailto:consultas@farmacopea.org.mx).

#### DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: \_\_\_\_\_  
Institución o empresa: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Correo electrónico: \_\_\_\_\_

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
<b>AETHUSA</b>		
<b>NOMBRE CIENTÍFICO.</b> <i>Aethusa cynapium</i> L.		
<b>FAMILIA.</b> <del>Umbelliferae.</del> <b>Apiaceae.</b>		
<b>SINÓNIMOS</b>		
<del>Latín.</del> <i>Aethusa cynapium.</i>		
<b>Español.</b> Cicuta menor, perejil bastardo, cicuta de los jardines.		
<del>Otros.</del> <i>Aethusa cynapium.</i>		
<b>DESCRIPCIÓN.</b> Herbácea anual de olor fétido, muy venenosa, con raíz ahusada larga, ramificada y blanquecina. El tallo, de 30 a 60 cm de altura, es redondo, está cubierto por follaje y tiene estrías; sin manchas, a menudo purpúreo; ramificado y en zigzag. Las hojas son de color verde intenso, doble o triplemente pinnatífidas, salpicadas con rojo, lanceoladas o en forma de cuña, lobuladas y algo decurrentes. Las flores son blancas y aparecen de julio a septiembre. Sin involucre, aunque la		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
presencia de un involucelo formado por tres hojas largas y estrechas, diferencia a esta planta del perejil de jardín, del cual se distingue también por el olor peculiar y desagradable de las hojas.		
<b>HÁBITAT.</b> Maleza común en los jardines y campos cultivados de toda Europa; también crece alrededor de terrenos agrícolas desde Nueva Inglaterra hasta Pennsylvania.		
<b>HISTORIA.</b> Fue introducida como medicamento a la práctica homeopática en 1828 por Nenning. (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i> , I: 59).		
<b>PARTE UTILIZADA.</b> La planta entera florida, fresca.		
<b>PREPARACIONES</b>		
<b>Tintura</b> φ. <b>FM Concentración</b> 1/10		
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 200 mL ..... 300 g		
Agua purificada ..... 200 mL		
Alcohol ..... 635 mL		
Para obtener 1 000 mL de tintura.		
<b>Dinamizaciones.</b> 2x, con un volumen de tintura, tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol ofical.		

\*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.