

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
DIGITALIS		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Digitalis purpurea</i> L.		
FAMILIA. Scrophulariaceae. Plantaginaceae.		
SINÓNIMOS.		
Español. Digital, dedalera.		
Otros. <i>Digitalis purpurea.</i> <i>Campanula sylvestris.</i>		
DESCRIPCIÓN. Es una planta bianual caducifolia, cuya raíz tiene numerosas ramificaciones delgadas y largas. Tallo solitario o ramificado, de 1 a 2 m de alto, recto como vara, foliáceo, redondeado y con ligeros ángulos, pubescente, de color rojizo. Las hojas son alternas, ovadas y oblongodentadas, ásperas, pubescentes; las más grandes miden 30 cm de largo, y son verdes por el haz y blancuzcas por el envés. Las flores son numerosas, a veces en número de 60, y aparecen de junio a agosto en un racimo terminal, erecto, unilátero, simple y pendulante, casi en forma de campana, de 3 cm de		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
largo, color rojo purpúreo, a veces blanco, salpicadas en su interior con manchas color sangre y vellosidades.		
HÁBITAT. En el centro y sur de Europa, Inglaterra, Noruega, Madeira y las Azores; en terrenos arenosos, pastizales y bordes de caminos.		
HISTORIA. La introdujo a la práctica homeopática Hahnemann en 1805, <i>Frag. de Vir. Med. Pos.</i> 123. (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i> , IV: 92; X: 505, 655).		
PARTE UTILIZADA. Las hojas frescas del segundo año de crecimiento de la planta, recolectadas antes de la floración.		
PREPARACIONES		
Tintura φ. FM Concentración 1/10		
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 567 mL667 g		
Alcohol468 mL		
Para obtener 1 000 mL de tintura.		
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, cuatro volúmenes de agua purificada, cinco volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.