

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
DIOSCOREA		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Dioscorea villosa</i> L.		
FAMILIA. Dioscoreaceae.		
SINÓNIMOS.		
Latín. <i>Dioscorea villosa</i> , <i>Dioscorea quinata</i> Walter, <i>Dioscorea paniculata</i> Michx., <i>Dioscorea glauca</i> Muhl. ex L.C. Beck, <i>Dioscorea hirticaulis</i> Bartlett, <i>Dioscorea quaternata</i> Walter, <i>Ubiun quinatum</i> .		
Español. Raíz del cólico.		
Otros. <i>Dioscorea villosa</i> . <i>Ubiun quinatum</i> .		
DESCRIPCIÓN. Enredadera herbácea perenne, delgada, caducifolia, que crece a partir de tallos subterráneos nudosos y entrecruzados. Raíz horizontal, larga, ramificada, leñosa, curva, de color marrón claro por fuera y blanca por dentro, con arrugas longitudinales y muchas fibras largas, resistentes e inodoras. El tallo es redondo y retorcido, de 1.5 a 4.5 m de alto, generalmente liso		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
y desnudo. Las hojas radicales aparecen en grupos de cuatro casi opuestas; las superiores son alternas, pecioladas, más o menos pubescentes por el envés, acorazonadas y agudas. Las flores, pequeñas y de color verde amarillento, aparecen en julio, las estériles en panículas pendulantes, las fértiles en racimos inclinados.		
HÁBITAT. En regiones húmedas de Estados Unidos de América, principalmente de Nueva Inglaterra a Wisconsin y hacia el sur.		
HISTORIA. La menciona en literatura homeopática el Dr. Nichols en 1886, <i>Am., Hom., Observer</i> , III: 357. (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i> , IV: 123; X: 506).		
PARTE UTILIZADA. La raíz fresca recolectada antes de floración, o cuando el tallo muere en otoño.		
PREPARACIONES		
Tintura φ. FM-Concentración 1/10		
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 150 mL.....250 g		
Agua purificada250 mL		
Alcohol635 mL		
Para obtener 1 000 mL de tintura.		
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.