

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
DOLICHOS		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.		
FAMILIA. Leguminosae: Fabaceae.		
SINÓNIMOS.		
Latín. <i>Dolichos pruriens</i> L., <i>Carpopogon pruriens</i> (L.) Roxb., <i>Mucuna prurita</i> Wight, <i>Stizolobium pruriens</i> (L.) Medik. <i>Mucuna pruriens</i>.		
Maya. Chiikan.		
Español. Pica-pica, ojo de venado, guisante negro, chiporro.		
Otros. <i>Dolichos pruriens</i>.		
DESCRIPCIÓN. Es una planta herbácea trepadora, perennifolia, con tallo ramificado que se extiende hasta 3.5 m, siendo áspero al principio y glabro después. Las hojas son alternas, tripinnadas, en largos y ásperos peciolo cuya separación es de unos 30 cm en el tallo, con foliolos ovados enteros, agudos, lisos por el haz y		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
<p>ásperos por el envés. Las flores, de color purpúreo oscuro, aparecen de grupos de 3, sobre pedúnculos cortos, formando racimos axilares pendulantes. Sus vainas miden 8 cm de largo y 1.5 cm de ancho, y están cubiertas de vellos rojizos cortos, puntiagudos, de sección cuadrangular, prismáticos, los cuales tienen una sustancia granular que rellena parcialmente el espacio entre ellos. Al penetrar en la epidermis humana producen una inmensa comezón que se intensifica al rascarse o lavarse.</p>		
<p>HÁBITAT. Planta muy común en las Antillas y en otras regiones tropicales de América. En la República Mexicana en los estados de Oaxaca, Veracruz y Yucatán.</p>		
<p>HISTORIA. La menciona en literatura homeopática, en 1851, el Dr. Jacob Jeanes en el <i>N. A. Journal of Hom.</i> I: 209. (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i>, IV: 167).</p>		
<p>PARTES UTILIZADAS. Los vellos urticantes que cubren la vaina.</p>		
<p>PREPARACIONES</p>		
<p>Tintura ϕ. FM Concentración 1/10</p>		
<p>Vellos urticantes 100 g</p>		
<p>Alcohol c.b.p. 1 000 mL</p>		
<p>Para obtener 1 000 mL de tintura.</p>		
<p>Dinamizaciones. 2x y siguientes, con alcohol oficial.</p>		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.