

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

| Dice | Debe decir | Justificación* |
|---|------------|----------------|
| HYDRASTIS | | |
| NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Hydrastis canadensis</i> L. | | |
| FAMILIA. Ranunculaceae. | | |
| SINÓNIMOS. | | |
| Latín. <i>Hydrastis canadensis</i> , <i>Warneria canadensis</i> (L.) Mill. | | |
| Español. Raíz amarilla, sello de oro. | | |
| Otros. <i>Hydrastis canadensis</i> . | | |
| DESCRIPCIÓN. Herbácea perenne caducifolia, con rizoma horizontal grueso, nudoso, color amarillo intenso, debajo del cual se observan raíces delgadas. Tallo simple y erecto, de 15 a 30 cm de altura, subcilíndrico y posee vellosidades dirigidas hacia abajo. Hay dos hojas alternas cerca de la parte superior; las hojas inferiores son pecioladas, mientras que las superiores son sentadas; en ocasiones se presenta una hoja radical peciolada; limbo venoso, orbiculocordado | | |

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

| Dice | Debe decir | Justificación* |
|--|------------|----------------|
| en la base, con cinco a siete lóbulos, doblemente aserrado y con 10 a 22.5 cm de ancho en el ápice. Aparece una sola flor terminal apétala pequeña, erecta, de color blanco verdoso, durante abril y mayo. | | |
| HÁBITAT. Canadá y Estados Unidos de América; al oriente del Mississippi, principalmente en regiones boscosas. | | |
| HISTORIA. Se introdujo a la práctica homeopática en 1866, por las experimentaciones publicadas en <i>Am. Hom. Obs.</i> III: 516 (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i> , IV: 613). | | |
| PARTE UTILIZADA. La raíz fresca. | | |
| PREPARACIONES | | |
| Tintura φ. FM-Concentración 1/10 | | |
| 100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 233 mL333 g | | |
| Agua purificada167 mL | | |
| Alcohol635 mL | | |
| Para obtener 1 000 mL de tintura. | | |
| Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial. | | |
| Trituraciones. 1x y siguientes, con raíz seca. | | |

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.