"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.
Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____ **Cargo:** _____
Institución o empresa: _____ **Dirección:** _____
Teléfono: _____ **Correo electrónico:** _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
HYOSCYAMUS		
NOMBRE CIENTÍFICO. *Hyoscyamus niger* L.		
FAMILIA. *Solanaceae.*		
SINÓNIMOS.		
Latín. ~~*Hyoscyamus niger,*~~ *Hyoscyamus agresti* Kit. ex Schult., ~~*H. flavus,*~~ *Hyoscyamus lethalis* Salisb., *Hyoscyamus pallidus* Waldst. & Kit. ex Willd., *Hyoscyamus vulgaris* L., ~~*Jusquiami.*~~		
Español. Beleño, beleño negro.		
Otros. ~~*Hyoscyamus niger.*~~ *Jusquiami.* ~~*Hyoscyamus flavus.*~~		
DESCRIPCIÓN. Herbácea bianual caducifolia con raíz fusiforme y tallo cilíndrico ahusado, grueso, de 15 a 60 cm de altura, poco ramificado, cubierto por vellos largos que tienen en la punta una diminuta glándula negra. Las hojas son alternas, sentadas, con la parte superior fija, oblongas, irregularmente lobuladas, sinuodentadas, delgadas, de color verde		

CONSULTA

Dice	Debe decir	Justificación*
claro, híspidas, grandes abajo y que se convierten en brácteas más arriba. Las flores casi sentadas son de color amarillo sin lustre, están marcadamente reticuladas con venas purpúreas y aparecen de junio a agosto en inflorescencias axilares unilaterales, de tipo espiga, dotadas de follaje. La planta entera está densamente cubierta por vellos entretejidos y posee una exudación pegajosa de olor intenso.		
HÁBITAT. Europa, Asia y América, en suelos arenosos y sitios abandonados.		
HISTORIA. Introducida a la práctica homeopática por Hahnemann en 1805, *Frag. de Vir. Med. Pos.* (Allen, T. F., *Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura,* V: 25; X: 544).		
PARTES UTILIZADAS. Planta entera florida, fresca; recolectada al segundo año de crecimiento.		
PREPARACIONES		
Tintura φ. ~~FM~~ Concentración 1/10		
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 450 mL .....550 g		
Alcohol .....585 mL		
Para obtener 1 000 mL de tintura.		
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, cuatro volúmenes de agua purificada, cinco volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficinal.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.

CONSULTA