

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2023, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
NUX VOMICA		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Strychnos nux-vomica</i> L.		
FAMILIA. Loganiaceae.		
SINÓNIMOS		
Latín. <i>Strychnos nux-vomica</i>, <i>Nux-vomica officinarum</i>, <i>Solanum arboreum indicum máximum</i>, <i>Strychnos colubrina</i>, <i>S. ligustrina</i> . <i>Strychnos vomica</i> St.-Lag., <i>Strychnos nux-vomica</i> var. <i>oligosperma</i> Dop, <i>Strychnos ovalifolia</i> Stokes, <i>Strychnos spireana</i> Dop.		
Español. Nuez venenosa, nuez vómica.		
Otros. <i>Nux vomica officinarum</i> ,		
DESCRIPCION. Arbol perennifolio con tronco corto y grueso, torcido, de corteza lisa color ceniza, irregularmente ramificado; retoños lisos y de color verde oscuro.		
Hojas opuestas, de peciolo cortos, ovales, con tres a cinco nervios, brillantes y lisas por ambos lados, de 4 a 10 cm de longitud y de 2 a 8 cm de		



"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

Dice	Debe decir	Justificación*
ancho. Floración en invierno. Pequeñas flores de color blanco verdoso, en corimbos terminales.		
La baya es redonda, de 7 a 10 cm de diámetro, de color anaranjado brillante; cuando madura se cubre de una cubierta lisa y dura que contiene una pulpa gelatinosa en la que se encuentran las semillas, en número de una a cinco; éstas son planas e irregulares, de 2 cm de diámetro, 7 mm de grueso, cóncavoconvexas, con un ancho margen grueso dando la apariencia de una depresión central; son grises o verdes, córneas, brillantes.		
HÁBITAT. Asia, principalmente Sri Lanka.		
HISTORIA. Introducida en la práctica homeopática en 1805 por Hahnemann, <i>Frag. de Vir. Med. Pos.</i> 143. (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i> , VII: 83).		
PARTE UTILIZADA. La semilla.		
PREPARACIONES		
Tintura ϕ . FM 1/10		
Materia vegetal reducida a polvo grueso 100 g		
Agua purificada 200 mL		
Alcohol 84 mL		
Para obtener 1 000 mL de tintura		
Dinamizaciones. 2x y siguientes, con alcohol oficial.		
Trituraciones. 1x y siguientes.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.