"2026, Año de Margarita Maza Parada"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2026, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sita en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México, o al correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre:		**Cargo:**	
Institución o empresa:		**Dirección:**	
Teléfono:		**Correo electrónico:**	

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
AESCULUS GLABRA		
NOMBRE CIENTÍFICO. *Aesculus glabra* Willd.		
FAMILIA. Sapindaceae.		
SINÓNIMOS		
Latín. *Aesculus echinata* Muhl., *Aesculus ohioensis* F.Michx., *Aesculus pallida* Willd., *Aesculus rubicunda* Lodd., *Aesculus watsoniana* D.Dietr., *Nebropsis glabra* (Willd.) Raf.		
Español. Castaño de Ohio; castaño fétido. **Otros.** Pavia glabra, pavia pallida, pavia watsoniana.		
DESCRIPCIÓN. Árbol caducifolio ornamental, de 4 m de altura; corteza lisa y de olor desagradable. Hojas tersas opuestas, digitadas y con venación recta. Las flores aparecen de mayo a junio en panículas terminales y son de color amarillo claro, a menudo polígamas, la mayoría con pistilos		

CONSULTA

Dice	Debe decir	Justificación*
imperfectos y estériles. El fruto está dentro de una cápsula, que en su etapa joven es espinosa. Las semillas son muy grandes, de color caoba, con una capa lustrosa externa en la cual hay una cicatriz redonda, grande y pálida.		
MATERIA EXTRAÑA. *MGA-FH 0030* no más de 2.0 %.		
CENIZAS TOTALES. *MGA-FH-0060* No más de 8.0 %.		
PÉRDIDA POR SECADO. *MGA 0671.* No más de 12% utilizando 1.0 g de la droga pulverizada.		
HÁBITAT. Norteamérica. Introducida en el norte de Asia, hasta el sur de Europa e Inglaterra. En Norteamérica se encuentra en las orillas de los ríos, desde el occidente de Pennsylvania hasta Michigan y Kentucky.		
HISTORIA. Introducida a la práctica homeopática por el Dr. Hale en 1864. *New Rem.* (Allen, T. F., *Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura,* I: 48).		
PARTE UTILIZADA. La nuez madura, fresca, sin cáscara.		
PREPARACIONES		
Tintura *φ.* Concentración 1/10 100 g de sólidos contenidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 120 mL .....220 g Agua purificada ..... 280 mL Alcohol ..... 635 mL Para obtener 1 000 mL de tintura.		

CONSULTA

Dice	Debe decir	Justificación*
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficinal.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.

Formato EP-PO-214/05-2

CONSULTA